

Espèce	Demande de validation						Exigences						Détermination	Remarques	Confusion	Difficulté
	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA				
<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	2	3	2	2		2	p,d	d	p,d	p,d		p,d	vue rapprochée	capture recommandée	<i>Anax imperator</i> , <i>Aeshna mixta</i>	2
<i>Aeshna caerulea</i> (Ström, 1783)			3	3	3	3			d	d	d	d	vue rapprochée	capture recommandée	autres espèces genre <i>Aeshna</i>	2
<i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		autres espèces genre <i>Aeshna</i>	2
<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	3	3	1				d	d	p,d	vue		<i>A. isoceles</i>	1
<i>Aeshna isoceles</i> (Müller, 1767)	1	*	*	*		2	p,d					p,d	vue		<i>A. grandis</i>	1
<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	<i>A. mixta</i> , <i>A. subarctica</i>	2
<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	3	*	*	*	2	*	p,d					p,d	vue rapprochée	capture recommandée	<i>A. juncea</i>	2
<i>Aeshna subarctica elisabethae</i> Djakonov, 1922	1		2		1		p,c		p			p,c	main		<i>A. juncea</i>	3
<i>Anax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	1	2	1	1		1	p,d	p,d	p,d	p,d		p,d	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	<i>A. parthenope</i>	2/3
<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	*	*	*	*	*	*							vue		<i>A. parthenope</i> ♀	2
<i>Anax parthenope</i> Sélys, 1839	3	*	3	3	1	3	d		d	d	p,d	d	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	<i>A. imperator</i> ♀, <i>A. ephippiger</i> ♂	2
<i>Boyeria irene</i> (Fonscolombe, 1838)		2	3			1		p,d	p,d			p,c	vue rapprochée	capture recommandée	<i>Aeshna cyanea</i> ♀	2
<i>Brachytron pratense</i> (Müller, 1764)	1	*	2	1			p,d		p,d	p,d			vue rapprochée	capture recommandée	<i>Aeshna cyanea</i>	2
<i>Calopteryx splendens caprai</i> Conci, 1956						3						p,c	vue rapprochée		<i>C. s. splendens</i>	3
<i>Calopteryx splendens splendens</i> (Harris, 1782)	*	*	*	*	3							p,c	vue rapprochée		<i>C. splendens caprai</i>	2
<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Sélys, 1873						3						p,c	main		<i>C. v. virgo</i>	3
<i>Calopteryx virgo virgo</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	3	3						p,c	main		<i>C. virgo meridionalis</i>	2
<i>Ceragrion tenellum</i> (De Villers, 1789)	1	2	2			2	p,d	p,d	p,d			p,d	vue rapprochée		<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	2
<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	3	2	*	*	*	1	d	p,c				p,c	vue rapprochée	capture recommandée	<i>Enallagma cyathigerum</i>	2/3
<i>Coenagrion lunulatum</i> (Charpentier, 1840)		+						p,c					main		<i>C. hastulatum</i>	2/3
<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	2	2	2	+	1		p	p	p	p,c	p,c		main		<i>C. ornatum</i>	2/3
<i>Coenagrion ornatum</i> (Sélys, 1850)	+	+					p,c	p,c					main		<i>C. mercuriale</i>	2/3
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	<i>C. pulchellum</i>	2/3
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	3	*	*	2	1	2	p,c			p,d	p,c	p,d	vue rapprochée	capture recommandée	<i>C. puella</i>	2/3
<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	2	2	2				p,c	p,c	p,c				main		<i>C. pulchellum</i>	2/3
<i>Cordulegaster bidentata</i> Sélys, 1843	*	*	*	*	3	*						p,d	vue rapprochée	capture recommandée	<i>C. boltonii</i>	2
<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	*	*	*	2	2	*						p,d	vue rapprochée	capture recommandée	<i>C. bidentata</i>	2
<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	3	3						p,d	main		<i>Somatochlora metallica</i>	2
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	*	*	*	*	3	*						d	vue rapprochée		<i>Sympetrum fonscolombii</i>	2
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	*	*	*	*	*	1						p,d	vue rapprochée		<i>Coenagrion hastulatum</i>	2
<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	2	2	2	+			p,d	p,d	p,d	p,c			vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	<i>Libellula quadrimaculata</i>	2
<i>Erythromma lindenii</i> (Sélys, 1840)	*	*	3	*	1	3			d		p,d	d	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	<i>Platycnemis pennipes</i>	2
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	*	*	*	2	1	1					p,c	p,c	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	<i>E. viridulum</i>	2
<i>Erythromma viridulum</i> Charpentier, 1840	*	*	*	*	1	*						p,c	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	<i>E. najas</i>	2
<i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825)		1						p,c					main		autres espèces genre <i>Gomphus</i>	2
<i>Gomphus pulchellus</i> Sélys, 1840	*	*	2	+					p,d	p,c			vue rapprochée		autres espèces genre <i>Gomphus</i>	2
<i>Gomphus simillimus</i> Sélys, 1840		2							p				main		autres espèces genre <i>Gomphus</i>	2
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	3	*	3			2	p,d		p,d			p	vue rapprochée		autres espèces genre <i>Gomphus</i>	2
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		<i>I. pumilio</i>	2
<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	<i>I. elegans</i>	2/3
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	3	3	3		3		p	p	p		p		main		autres espèces genre <i>Lestes</i>	2
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	2	2	2	2	2		p,c	p,c	p,c	p,c	p,c		main		<i>L. sponsa</i>	2/3
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	*	*	*	*	*	*							main		<i>L. dryas</i>	2/3
<i>Lestes virens vestalis</i> Rambur, 1842	1	2	2			1	p,c	p,c	p,c			p,c	main		<i>L. sponsa</i> , <i>L. viridis</i>	2/3
<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	*	*	*	*	2	*						p,d	main			2
<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	+	2	1	2			p,c	p,c	p,c	p,c			vue rapprochée		<i>L. caudalis</i> ♀	2
<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)		2						p,c					vue rapprochée		<i>L. albifrons</i> ♀	2
<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		<i>L. rubicunda</i>	2
<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	2	2	2				p,d	p,d	p,d				vue rapprochée			2
<i>Leucorrhinia rubicunda</i> (Linnaeus, 1758)		1						p,c					main		<i>L. dubia</i>	3
<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*							vue			1
<i>Libellula fulva</i> Müller, 1764	2	*	*	2		2	p,d				p,d	p,d	vue			1
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*							vue			1
<i>Nehalennia speciosa</i> (Charpentier, 1840)		2						p,c					main			2

Espèce	Demande de validation						Exigences						Détermination	Remarques	Confusion	Difficulté
	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA				
<i>Onychogomphus f. forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	3	3	3	1			p	p	p	p,c			main		<i>O. forcipatus unguiculatus</i>	2
<i>O. forcipatus unguiculatus</i> (Vander Linden, 1820)						3						p,d	main		<i>O. f. forcipatus</i>	2
<i>Onychogomphus uncatatus</i> (Charpentier, 1840)		+						p,c					main		<i>O. forcipatus</i>	2
<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1758)	1	*	3				p,c		p,d				vue rapprochée			2
<i>Orthetrum albistylum</i> (Sélys, 1848)	3	3	2	1	1	2	p,d		p,d	p,c	p,c	p,d	vue rapprochée		<i>O. cancellatum</i>	2
<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)	3	*	3	1	1	3	p,d		p,d	p	p		vue rapprochée	capture recommandée	<i>O. coerulescens</i>	2
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		<i>O. albistylum</i>	2
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	3	3	3	3	3	3	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	vue rapprochée	capture recommandée	<i>O. brunneum</i>	2
<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)		+				3		p,c				d	vue rapprochée			2
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	*	*	*	*	2	*						p,c	vue rapprochée			2
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée			2
<i>Somatochlora alpestris</i> (Sélys, 1840)	+	+	*	*	*	*	p,c	p,c					main		<i>S. arctica</i>	2
<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	2	2	2	2	2	2	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	main		<i>S. alpestris</i> , <i>S. flavomaculata</i>	2
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	2	*	*	2	1	*	p,d			p,d	p,d		main		<i>S. arctica</i> , <i>S. metallica</i>	2
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	*	*	*	2	*	*				p,d			main		<i>Cordulia aenea</i>	2
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	*	*	*	*	2	*					p,d		main		<i>S. paedisca</i>	2
<i>Sympecma paedisca</i> Brauer, 1877		2		2				p,c		p,c			main		<i>S. fusca</i>	2
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	*	*	*	*	*	*							vue			1
<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Sélys, 1841)	1	3	2	2	1	1	p,c	p,d	p,d	p,d	p,c	p,c	main		<i>S. sanguineum</i>	2
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	3	3	3	+	3	1	d	d	d	p,c	d	p,c	vue rapprochée		<i>S. fonscolombii</i> , <i>S. sanguineum</i>	2
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Sélys, 1840)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		<i>Crocothemis erythraea</i> , <i>S. flaveolum</i>	2
<i>Sympetrum meridionale</i> (Sélys, 1841)	3	3	3	1	1	1	p,d	p,d	p,d	p,c	p,c	p,c	main		<i>S. vulgatum</i>	2
<i>Sympetrum pedemontanum</i> (Allioni, 1766)	3	3	3	+	3	+	d	d	d	p,c	d	p,c	vue			1
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		<i>S. depressiusculum</i>	2
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	<i>S. vulgatum</i>	2
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	<i>S. striolatum</i>	2

JU = Jura, PL = Plateau, NA = Versant nord des Alpes, AIW = Alpes internes occidentales, AIO = Alpes internes orientales, SA = Versant sud des Alpes

Toutes les espèces non signalées à ce jour de Suisse sont bien évidemment soumises à validation

Demande de validation

- 1: systématique
- 2: pour sites / régions nouveaux (y. c. redécouverte)
- 3: demande ponctuelle

Pour les espèces non encore observées dans une région biogéographique ou considérées comme disparues (+), validation systématique (1) avec exigence la plus élevée.

L'absence de chiffre dans une colonne n'empêche pas qu'une demande soit néanmoins faite pour la région biogéographique correspondante, dans des cas particuliers (localisation aberrante, marginale, etc.).

Exigences

- c: collection (1 individu, mâle si possible)*
- p: photo (avec vue des critères différentiels!)*
- d: description sur le terrain de l'observation et des critères différentiels relevés

* Pour les espèces très localisées, 1 preuve (p ou c) est demandée par (nouveau) site (pas pour chaque observation), pour les autres, au moins 1 preuve (p ou c) par région biogéographique et par observateur, + 1 preuve par "sous-région" où aucune observation récente n'est mentionnée

Méthode de détermination

- Main: individu capturé, en main
- Vue: détermination à vue, sans capture
- Vue rapprochée: à vue de près ou avec jumelles (critères différentiels bien visibles)

Difficulté de détermination

- 1: pas de difficulté particulière
- 2: difficulté moyenne, récolte / photo d'un individu recommandée pour débutants
- 3: examen attentif nécessaire sur le terrain critères difficiles (génitalias, etc.), récolte / photo d'un individu recommandée

Dans certains cas, pas de demandes de validation ou validation simplifiée:

- si les renseignements et documents fournis directement avec la donnée suffisent (photos, mode de détermination, attention particulière apportée à l'observation, etc.)
- en fonction de l'expérience de l'observateur (validation simplifiée)