

**Géranium sanguin Blutroter Storchschnabel Geranio sanguineo**  
*Geranium sanguineum*

*Buprestidae: Habroloma nana*



Imago 2-3 mm  
photo: Museum de Genève



Oeuf photo S. Barbalat  
Ei; Uovo



Mine face sup. photo S. Barbalat  
Mine auf Blattoberseite; Gallerie sul lato  
sup. della foglia



Mine face inf. photo S. Barbalat  
Mine auf Blattunterseite  
Gallerie sul lato inf. della foglia

**Käfer** von April bis September mit Schwerpunkt im Juni auf den Blättern der Wirtspflanze (Brechtel & Kostenbader 2002).

**Eier** auf der Blattoberseite der Wirtspflanze.

**Minen** in den Blättern des Blutroten Storchschnabels v.a. an trockenen und warmen Orten mit suboptimalen Bedingungen für die Pflanze (Mühle).

Verlässlichkeit der Imago-Ansprache auf der Wirtspflanze +++

Verlässlichkeit der Minen-Ansprache auf der Wirtspflanze +++

Vorläufige RL-Kategorie: 2

**Adultes** d'avril à septembre mais surtout en juin sur les feuilles de leur plante-hôte (Brechtel & Kostenbader 2002).

**Oeufs** sur la face supérieure de la plante-hôte.

**Mines** dans les feuilles de géranium sanguin surtout dans les endroits secs et chauds, où il n'est pas à son optimum (Mühle).

Fiabilité de l'identification imago sur la plante-hôte +++

Fiabilité de l'identification de la mine sur la plante-hôte +++

Statut LR provisoire: 2

**Adulti** da aprile a settembre, ma soprattutto in giugno su foglie della loro pianta ospite (Brechtel & Kostenbader 2002).

**Uova** sul lato superiore delle foglie della pianta ospite.

**Gallerie** nelle foglie di geranio sanguineo, soprattutto in zone secche e calde, che non rappresentano però l'habitat ottimale per la pianta (Mühle).

Affidabilità determinazione adulto su pianta ospite +++

Affidabilità determinaz. gallerie su pianta ospite +++

LR provvisoria: 2