

Tierart	Gültigkeitsüberprüfung						Anforderungen						Bestimmung	Bemerkungen	Verwechslungen	Schwierigkeit
	JU	MI	AN	WZA	OZA	AS	JU	MI	AN	WZA	OZA	AS				
Aeshna affinis Vander Linden, 1820	1	3	1	1		2	p,d	d	p,d	p,d		p,d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	Anax imperator, Aeshna mixta	2
Aeshna caerulea (Ström, 1783)			3	3	3	3			d	d	d	d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	andere Arten Gattung Aeshna	2
Aeshna cyanea (Müller, 1764)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung			2
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)	*	*	*	3	3	1			d	d		p,d	Sichtbeobachtung		A. isoceles	1
Aeshna isoceles (Müller, 1767)	1	*	*	*		3	p,d					d	Sichtbeobachtung		A. grandis	1
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	A. mixta, A. subarctica	2
Aeshna mixta Latreille, 1805	3	*	*	*	1	*	p,d					p,d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	A. juncea	2
Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922	2		2		2		p,c		p			p	Handbestimmung		A. juncea	3
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)	1	1	1	1		1	p,d	p,d	p,d	p,d		p,d	Nahe Sichtbeobachtung	mit Ferngals (Fang oft schwierig)	A. parthenope	2/3
Anax imperator Leach, 1815	*	*	*	*	*	*							Sichtbeobachtung		A. parthenope ♀	2
Anax parthenope Sélys, 1839	3	*	3	3		3	d	d	d			d	Nahe Sichtbeobachtung	mit Ferngals (Fang oft schwierig)	A. imperator ♀, A. ephippiger ♂	2
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)		2	3			1		p,d	p,d			p,c	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	Aeshna cyanea ♀	2
Brachytron pratense (Müller, 1764)	1	*	*	1			p,d		p,d				Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	Aeshna cyanea	2
Calopteryx splendens caprai Conci, 1956						3						p,c	Nahe Sichtbeobachtung		C. s. splendens	3
Calopteryx splendens splendens (Harris, 1782)	*	*	*	*	3							p,c	Nahe Sichtbeobachtung		C. splendens caprai	2
Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 1873						3						p,c	Handbestimmung		C. v. virgo	3
Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	3	3						p,c	Handbestimmung		C. virgo meridionalis	2
Ceriagrion tenellum (De Villers, 1789)	2	2	2			2	p,d	p,d	p,d			p,d	Nahe Sichtbeobachtung		Pyrrhosoma nymphula	2
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)	3	2	*	*	*	1	d	p,c				p,c	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	Enallagma cyathigerum	2/3
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)		+						c					Handbestimmung		C. hastulatum	2/3
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	2	2	2	+	1	+	p	p	p	c	p,c	c	Handbestimmung		C. ornatum	2/3
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)	+	+					c	c					Handbestimmung		C. mercuriale	2/3
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	C. pulchellum	2/3
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)	3	*	*	2	1	2	p,c		p,d	p,c		p,d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	C. puella	2/3
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)	2	2	2				p,c	p,c	p,c				Handbestimmung		C. pulchellum	2/3
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843	*	*	*	*	3	*						p,d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	C. boltonii	2
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)	*	*	*	2	2	*				p,d		p,d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	C. bidentata	2
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	3	3						p,d	Handbestimmung		Somatochlora metallica	2
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)	*	*	*	*	3	*						d	Nahe Sichtbeobachtung		Sympetrum fonscolombii	2
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung		Coenagrion hastulatum	2
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)	2	2	2	+			p,d	p,d	p,d	p,c			Nahe Sichtbeobachtung	mit Ferngals (Fang oft schwierig)	Libellula quadrimaculata	2
Erythromma lindenii (Sélys, 1840)	*	*	3	*	1	3			d			p,d	Nahe Sichtbeobachtung	mit Ferngals (Fang oft schwierig)	Coenagrionidae	2
Erythromma najas (Hansemann, 1823)	*	*	*	2	1	1				p,c	p,c	p,c	Nahe Sichtbeobachtung	mit Ferngals (Fang oft schwierig)	E. viridulum	2
Erythromma viridulum Charpentier, 1840	*	*	*	*	1	*						p,c	Nahe Sichtbeobachtung	mit Ferngals (Fang oft schwierig)	E. najas	2
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)		1							p,c				Handbestimmung		andere Arten Gattung Gomphus	2
Gomphus pulchellus Sélys, 1840	*	*	2	+					p,d	c			Nahe Sichtbeobachtung		andere Arten Gattung Gomphus	2
Gomphus simillimus Sélys, 1840		2							p				Handbestimmung		andere Arten Gattung Gomphus	2
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)	3	*	3			2	p,d		p,d			p	Nahe Sichtbeobachtung		andere Arten Gattung Gomphus	2
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung			2
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	I. elegans	2/3
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)	3	3	3		3		p	p	p			p	Handbestimmung		andere Arten Gattung Lestes	2
Lestes dryas Kirky, 1890	2	2	2	2	2		p,c	p,c	p,c	p,c		p,c	Handbestimmung		L. sponsa	2/3
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)	*	*	*	*	*	*							Handbestimmung		L. dryas	2/3
Lestes virens vestalis Rambur, 1842	1	2	2			1	c	p,c	p,c			c	Handbestimmung		L. sponsa, L. viridis	2/3
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)	*	*	*	*	2	*						p,d	Handbestimmung			2
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)	+	2	1	2			c	p,c	c	p,c			Nahe Sichtbeobachtung		L. caudalis ♀	2
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)	*	2			*	*				p,c			Nahe Sichtbeobachtung		L. albifrons ♀	2
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung		L. rubicunda	2
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)	1	2	2				p	p,d	p,d				Nahe Sichtbeobachtung			2
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)	*	1			*	*				c			Handbestimmung		L. dubia	3
Libellula depressa Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*							Sichtbeobachtung			1
Libellula fulva Müller, 1764	2	*	*	2		2	p,d		p,d			p,d	Sichtbeobachtung			1
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*							Sichtbeobachtung			1
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)		2							p,c				Handbestimmung			2

Tierart	Gültigkeitsüberprüfung						Anforderungen						Bestimmung	Bemerkungen	Verwechslungen	Schwierigkeit
	JU	MI	AN	WZA	OZA	AS	JU	MI	AN	WZA	OZA	AS				
Onychogomphus f. forcipatus (Linnaeus, 1758)	3	3	3	1			p	p	p	p,c			Handbestimmung		O. forcipatus unguiculatus	2
Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1820)						3						p,d	Handbestimmung		O. f. forcipatus	2
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)		+						p,c					Handbestimmung		O. forcipatus	2
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758)	1	*	3				p,c		p,d				Nahe Sichtbeobachtung			2
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848)	3	3	2	1	1	2	p,d		p,d	p,c	p,c	p,d	Nahe Sichtbeobachtung		O. cancellatum	2
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)	3	*	3	1	1	3	p,d		p,d	p	p		Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	O. coerulescens	2
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung		O. albistylum	2
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)	2	3	3	2	3	3	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	O. brunneum	2
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)		+				3		c				d	Nahe Sichtbeobachtung			2
Platynemesis pennipes (Pallas, 1771)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung			2
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung			2
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840)	+	+	*	*	*	*	c	c					Handbestimmung		S. arctica	2
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)	2	2	2	2	2	2	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	Handbestimmung		S. alpestris, S. flavomaculata	2
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)	2	*	*	2	1	*	p,d			p,d	p,d		Handbestimmung		S. arctica	2
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)	*	*	*	2	*	*				p,d			Handbestimmung		Cordulia aenea	2
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)	*	*	*	*	*	*							Handbestimmung		S. paedisca	2
Sympecma paedisca Brauer, 1877		2		2				p,c		p,c			Handbestimmung		S. fusca	2
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)	*	*	*	*	*	*							Sichtbeobachtung			1
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)	1	3	2	2	1	1	p,c	p,d	p,d	p,d	p,c	p,c	Handbestimmung		S. sanguineum	2
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)	3	3	3	+	3	1	d	d	d	p,c	d	p,c	Nahe Sichtbeobachtung		S. sanguineum	2
Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung		Crocothemis erythraea	2
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)	3	3	3	1	1	1	p,d	p,d	p,d	p,c	p,c	p,c	Handbestimmung		S. vulgatum	2
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)	3	3	3	+	3	+	d	d	d	p	d	p	Sichtbeobachtung			1
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung		S. depressiusculum	2
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	S. vulgatum	2
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							Nahe Sichtbeobachtung	Fang empfehlenswert	S. striolatum	2

JU = Jura, MI = Mittelland, AN = Alpennordflanke, WZA = Westliche Zentralalpen, OZA = Östliche Zentralalpen, AS = Alpensüdflanke

Alle bis heute noch nicht in der Schweiz nachgewiesene Arten werden automatisch einer Überprüfung unterstellt

Gültigkeitsüberprüfung

- 1: in jedem Falle
- 2: für neue Standorte / Regionen (inklusive Wiederentdeckung)
- 3: in einzelnen Fällen

Für zuvor in der biogeografischen Region noch nie nachgewiesene oder verschwundene Arten (+) ist in jedem Falle (1) eine Gültigkeitsüberprüfung mit den höchsten Anforderungen erforderlich

Die Abwesenheit von Einträgen in den Spalten bedeutet nicht, dass für die betroffene biogeografische Region in besonderen Fällen (spezieller oder marginaler Fundstandort, etc.) eine Gültigkeitsüberprüfung vorgenommen wird.

Anforderungen

- c: Sammeln (1 Individuum, Männchen falls möglich)*
p: Foto (mit Ansicht der artbestimmenden Merkmale!)*
d: Betrachtung und wenn nötig Beschreibung der artbestimmenden Merkmale
* Für eng lokal vorkommende Arten wird 1 Beleg (p oder c) pro (neuen) Standort (nicht für jede Beobachtung) verlangt.
* Für die anderen Arten mindestens 1 Beleg (p oder c) pro biogeografische Region und pro Beobachter, + 1 Beleg pro "Unterregion" für die keine neuere Beobachtung vorliegt.

Bestimmungsmethode

- Handbestimmung: Individuum gefangen und in der Hand bestimmt
Sichtbeobachtung: Bestimmung per Sichtkontakt, ohne Handfang
Nahe Sichtbeobachtung: naher Sichtkontakt oder Betrachtung mit Fernglas (artbestimmende Merkmale gut sichtbar)

Schwierigkeitsgrad der Bestimmung

- 1: Bestimmung bietet keine besondere Schwierigkeiten
- 2: mittlerer Schwierigkeitsgrad, Sammeln / Foto eines Individuums für Anfänger
- 3: sorgfältige Untersuchung im Felde nötig, schwierige Merkmale (Genitalia, etc.), Sammlung / Foto eines Individuums empfohlen

In bestimmten Fällen wird keine Gültigkeitsüberprüfung oder dann nur eine vereinfachte Überprüfung benötigt:

- falls die mit der Beobachtung mitgelieferten Beschreibungen und Dokumente genügen (Fotos, Bestimmungsart, der Beobachtung besondere Beachtung geschenkt, etc.)
- In Abhängigkeit von der Erfahrung des Beobachters (vereinfachte Gültigkeitsüberprüfung)