

## Taille des populations d'amphibien

selon "l'atlas de distribution des amphibiens suisses" -  
 Kurt Grossenbacher 1988 - Documenta Faunistica Helvetiae 8

### Tailles des populations:

- (0) Eteints: Est considéré comme éteinte après 5 ans sans observation sur un site
- (1) Petite population
- (2) Population moyenne
- (3) Grande population
- (4) Très grande population
- (-1) Inconnue : Nombres d'individus inconnu, données manquantes

Taille des populations:	(1) Petite	(2) Moyenne	(3) Grande	(4) Très grande
<b>Pontes:</b> Grenouille rousse ( <i>R. temporaria</i> )	1 à 40	40 à 100	100 à 400	Plus de 400
<b>Pontes:</b> Grenouille agile ( <i>R. dalmatina</i> ) Grenouille de Lataste ( <i>R. latastei</i> )	1 à 9	10 à 50	50 à 200	Plus de 200
<b>Adultes:</b> Grenouille rousse ( <i>R. temporaria</i> ) Grenouille agile ( <i>R. dalmatina</i> ) Grenouille de Lataste ( <i>R. latastei</i> ) Crapaud commun ( <i>B. bufo</i> )	1 à 5	5 à 50	51 à 200	Plus de 200
<b>Adultes:</b> Sonneurs ( <i>B. variegata</i> ) Crapaud calamite ( <i>B. calamita</i> ) Grenouilles vertes ( <i>Pelophylax</i> <i>agg.</i> )	1 à 5	6 à 30	31 à 100	Plus de 100
<b>Adultes:</b> Rainettes ( <i>H. arborea</i> ) Crapauds accoucheurs ( <i>A. obstetricans</i> )	1 à 5	6 à 20	21 à 60	Plus de 60
Toutes les espèces de tritons*	1 à 3	4 à 10	11 à 40	Plus de 40
<b>Adultes:</b> Salamandres tachetées ( <i>S. salamandra</i> )	1 à 3	4 à 10	11 à 20	Plus de 20
<b>Larves:</b> Salamandres tachetées ( <i>S. salamandra</i> )	1 à 20	20 à 50	50 à 100	Plus de 100

\* *Lissotriton helveticus*, *Lissotriton vulgaris*, *Ichthyosaura alpestris*, *Triturus carnifex*, *Triturus cristatus*

Salamandre noire (*S. atra*) : trop dispersées pour pouvoir être considérée dans ce tableau