

Taille des populations d'amphibien

selon "l'atlas de distribution des amphibiens suisses" -
 Kurt Grossenbacher 1988 - Documenta Faunistica Helvetiae 8

Tailles des populations:

- (0) Eteints: Est considéré comme éteinte après 5 ans sans observation sur un site
- (1) Petite population
- (2) Population moyenne
- (3) Grande population
- (4) Très grande population
- (5) Inconnue : Nombres d'individus inconnu, données manquantes

Taille des populations:	(1) Petite	(2) Moyenne	(3) Grande	(4) Très grande
Pontes: Grenouille rousse (<i>R. temporaria</i>)	1 à 40	40 à 100	100 à 400	Plus de 400
Pontes: Grenouille agile (<i>R. dalmatina</i>) Grenouille de Lataste (<i>R. latastei</i>)	1 à 9	10 à 50	50 à 200	Plus de 200
Adultes: Grenouille rousse (<i>R. temporaria</i>) Grenouille agile (<i>R. dalmatina</i>) Grenouille de Lataste (<i>R. latastei</i>) Crapaud commun (<i>B. bufo</i>)	1 à 5	5 à 50	51 à 200	Plus de 200
Adultes: Sonneurs (<i>B. variegata</i>) Crapaud calamite (<i>B. calamita</i>) Grenouilles vertes (<i>Pelophylax</i> <i>agg.</i>)	1 à 5	6 à 30	31 à 100	Plus de 100
Adultes: Rainettes (<i>H. arborea</i>) Crapauds accoucheurs (<i>A. obstetricans</i>)	1 à 5	6 à 20	21 à 60	Plus de 60
Toutes les espèces de tritons*	1 à 3	4 à 10	11 à 40	Plus de 40
Adultes: Salamandres tachetées (<i>S. salamandra</i>)	1 à 3	4 à 10	11 à 20	Plus de 20
Larves: Salamandres tachetées (<i>S. salamandra</i>)	1 à 20	20 à 50	50 à 100	Plus de 100

* *Lissotriton helveticus*, *Lissotriton vulgaris*, *Ichthyosaura alpestris*, *Triturus carnifex*, *Triturus cristatus*

Salamandre noire (*S. atra*) : trop dispersées pour pouvoir être considérée dans ce tableau