

Impact du laurier-cerise sur la flore neuchâteloise

Par Plume Sandoz, année académique 2025/2026

Les espèces exotiques invasives menacent la biodiversité locale de nos régions. Leur propagation est accélérée et facilitée par le réchauffement climatique déplaçant les limites écologiques. Comprendre les conséquences de leur arrivée est essentiel à la compréhension et l'anticipation des changements écosystémiques.

Le laurier-cerise, objet de notre recherche, est une plante invasive qui s'est installée dans nos régions, provenant à l'origine d'Asie mineure.



Image de laurier-cerise sur site

OBJECTIFS

Evaluer l'impact du laurier-cerise (*Prunus laurocerasus*) sur la biodiversité des forêts neuchâteloise, si il y a diminution de la diversité des espèces.

RÉSULTATS

Aucune différence significative de diversité spécifique ou de composition floristique n'a été observée entre les sites avec et sans laurier-cerise. La présence de cette espèce ne diminue pas la diversité spécifique du milieu. Toutefois, une tendance montre que la croissance de cet arbuste pourrait à long terme réduire l'espace disponible pour d'autres espèces.

Auteur : Plume Sandoz

Responsable externe : Sergio Rasmann, laboratoire d'écologie fonctionnelle

Responsable interne : Daniel Hunkeler, Unine